

Palermo, marzo 10 de 2020.

**CIRCULAR No 12 DE 2020**

**CIRCULAR 11 MINEDUCACIÓN – MINSALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL**

DE: RECTORÍA  
PARA: PADRES DE FAMILIA EN GENERAL

Apreciados padres de familia, de manera sincera deseamos e invocamos todas las bendiciones para las familias.

El Coronavirus, es un virus que causa Infección Respiratoria Aguda - IRA-, es decir gripa, que puede llegar a ser leve, moderada o grave. La Infección Respiratoria Aguda - IRA - es reconocida como una de las principales causas de consultas, especialmente entre los niños menores de 5 años y los adultos mayores de 65 años. Entre las principales razones de la afectación a estos dos grupos poblacionales es que el primero de ellos presenta una alta vulnerabilidad de su sistema inmunológico y el segundo grupo suele presentar enfermedades crónicas que los predisponen a cursar con cuadros más severos de IRA.

De acuerdo con la Circular No 11 del Ministerio de Educación Nacional y el Ministerio de Salud y Protección Social se establecieron las medidas de contingencia para mitigar el riesgo de contagio de la epidemia del coronavirus, nos permitimos puntualizar algunas recomendaciones que contribuirán, de manera directa, a minimizar el riesgo.

1. Implementar rutinas de lavado frecuente de las manos con agua y jabón, esto disminuye en un 50% la posibilidad de infectarse. El lavado de manos debe ser de 40 a 60 segundos, en especial en los siguientes momentos: al llegar a la institución educativa; al salir al descanso antes de ingerir alimentos y bebidas, antes de entrar nuevamente al salón; al llegar a casa; después de cualquier actividad física; o cuando las manos están contaminadas por secreción respiratoria después de toser o estornudar y al saludar de mano a otras personas, y después de ir al baño.
2. En los eventos que no sea posible el lavado de manos, utilizar gel antibacteriano o alcohol glicerinado.
3. Evitar el contacto y saludar de mano o de beso a personas con gripa, tos.


4. Tapar la boca y nariz cuando va a cambiar de temperatura, principalmente en las mañanas y en las noches.
5. Cuando se estornuda o tose, cubrirse nariz y boca con el antebrazo, o usar un pañuelo desechable y limpiar las manos después.
6. Los niños mayores de 3 años, desde el inicio de su sintomatología respiratoria, deben usar tapabocas y, en lo posible, no asistir a clases para no exponer a los demás niños y permitir un mejor cuidado en casa.
7. Revisar que se mantengan los esquemas de vacunación completos, de acuerdo con la edad.
8. Recomendar a los estudiantes, personal administrativo o docentes, no asistir a la institución educativa y permanecer en casa, ante síntomas de gripa o tos.
9. Mantener a los estudiantes, al personal administrativo o del cuerpo docente que presenten cuadros gripales, separados de aquellos que estén sanos, hasta que se puedan ir a su casa. Se recomienda mantener más de dos (2) metros de distancia.
10. Recomendar el uso de tapabocas sólo cuando se presentan síntomas de gripa.
11. Utilizar desinfectantes o alcohol para la limpieza de los objetos, superficies zonas y materiales de uso constante, así como la desinfección diaria de áreas comunes como comedores, baños, salas de juegos, salones, auditorios y bibliotecas
12. Recomendar la utilización de pañuelos desechables para sonarse y no tocarse la nariz, los ojos o la boca.
13. Establecer procedimientos para garantizar que los estudiantes, docentes y personal administrativo que se enfermen en la institución educativa, o lleguen enfermos a ella, sean enviados a su casa lo antes posible.
14. Orientar a las familias de los estudiantes para que conozcan y comprendan las razones por la cuales, en caso de presentar síntomas de gripa, es recomendable no enviar los niños a la institución educativa.

15. Crear planes de comunicación para usarlos con la comunidad escolar si se presentan alguno de los siguientes síntomas: respiración más rápida de lo normal, fiebre de difícil control por más de dos días, si el pecho le suena o le duele al respirar, somnolencia o dificultad para despertar, ataques o convulsiones, decaimiento, deterioro del estado general en forma rápida.

Observar las recomendaciones anteriores no nos hace inmunes al virus, pero puede mitigar el riesgo de contagio en un alto porcentaje.

Que Dios los bendiga,

Cordial saludo,



**JAIME RIVERA CORTÉS**

Rector